



HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Vinogradska cesta 29 10 000 Zagreb Tel: +385 1 3787906 Fax: +385 1 3787244 E-mail: hkzr@hkzr.hr URL: www.hkzr.hr OIB: 1

Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Datum: 12.12.2025.

Org. jed.
09

Klasa: UP/I-131-04/25-07/34

Ur. br: 351/09-25-1

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE

NAZIV USTANOVE:	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA			
ADRESA:	52100 Pula, Nazorova 23			
NAZIV STRUKOVNOG RAZREDA:	Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost			
TELEFON:	052/529-095	FAX:		E-MAIL: serologija@zzjz.hr

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS I CILJ	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
Veljača 20.02.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Epidemije i pandemije: jesmo li spremni za sljedeću?	Epidemije i pandemije oblikovale su ljudsku povijest, a u posljednjim desetljećima postale su učestalije zbog globalne mobilnosti, klimatskih promjena i sve češćih kontakata ljudi sa životinjama. Primjeri poput SARS-a, COVID-19, Nipah virusa i visoko patogene avijarne influence H5N1 pokazuju da se nove i ponovno pojavljujuće bolesti javljaju brže i na mjestima gdje ih ne očekujemo. Ključno pitanje nije više da li će se pojaviti sljedeća pandemija, nego koliko je društvo spremno reagirati. Uz znanje, suradnju i dobro organizirane sustave, društvo može biti spremnije za neku sljedeću krizu.	dr.sc. Branka Sep-Ševerdija, dr. med., spec. epidemiologije Katarina Branežac, mag. sanit. ing Gita Knezović, sanit.ing.	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor
Ožujak 27.03.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Trbušni tifus- prikaz slučaja	Trbušni tifus je sistemska infekcija uzrokovana bakterijom <i>Salmonella Typhi</i> , koja se prenosi feko-oralnim putem, najčešće kontaminiranom vodom ili hranom. Bolest se očituje postepenim razvojem abdominalnih tegoba i proljeva te može dovesti do ozbiljnih komplikacija ako se ne započne pravovremeno liječenje. Ovaj prikaz slučaja ističe važnost pravodobne prevencije, uključujući cijepljenje protiv trbušnog tifusa. Rizik obolijevanja raste pri boravku u zajednicama s improviziranim higijenskim uvjetima, osobito kada među sudionicima borave osobe iz endemskih područja.	dr.sc. Branka Sep-Ševerdija, dr. med., spec. epidemiologije	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor



HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Vinogradska cesta 29 10 000 Zagreb Tel: +385 1 3787906 Fax: +385 1 3787244 E-mail: hkzr@hkzr.hr URL: www.hkzr.hr OIB: 06195840134

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS I CILJ	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
Travanj 24.04.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Importiran slučaj malarije u Istarskoj županiji – prikaz slučaja	Malarija je jedna od najznačajnijih zaraznih bolesti u tropskim i sup-tropskim područjima, odgovorna za visoki morbiditet i mortalitet u svijetu. U neendemskim zemljama, poput Hrvatske, pojavljuje se is-ključivo kao importirana bolest, najčešće kod putnika iz endemskih područja. Ovaj prikaz slučaja naglašava važnost detaljne epidemiolo-ške anamneze, pravovremene dijagnostike febrilnih stanja nakon puto-vanja te edukacije putnika o rizicima i potrebi provođenja obavezne kemoprofilakse kod putovanja u endemska malarična područja.	dr.sc. Branka Sep-Ševerdija, dr. med., spec. epidemiologije prim. Jasmina Kučinar, dr. med., spec. mikrobiologije Ljiljana Lazičić-Putnik, dr. med. Aleksandar Stojanović, dr. med., spec. epidemiologije	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor
Lipanj 19.06.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Šišmiši i rizik od bjesnoće u Istarskoj županiji- javnoz- dravstveni izazovi u zemlji slobodnoj od bjesnoće	Iako je Hrvatska službeno slobodna od bjesnoće, šišmiši i dalje predstavljaju prirodni rezervoar <i>lyssavirusa</i> . Analizirani su slučajevi potencijalne izloženosti ljudi šišmišima u Istarskoj županiji od 2021. do 2025. godine. Zabilježena su 22 kontakta, najčešće okružna bez vidljivih ozljeda. U 68% slučajeva primjenjena je aktivna i pasivna zaštita, a u 32% slučajeva samo aktivna. Pravodobna procjena rizika i jasno definirani protokoli ključni su za zaštitu ljudi uz istodobno očuvanje populacije šišmiša.	dr.sc. Branka Sep-Ševerdija, dr. med., spec. epidemiologije Katarina Branežac, mag. sanit. ing Gita Knezović, sanit.ing.	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor



HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Vinogradska cesta 29 10 000 Zagreb Tel: +385 1 3787906 Fax: +385 1 3787244 E-mail: hkzr@hkzr.hr URL: www.hkzr.hr OIB: 06195840134

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS I CILJ	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
Rujan 25.09.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Pravilna higijena ruku u laboratoriju	Higijena ruku predstavlja temeljnu i najvažniju mjeru biosigurnosti u mikrobiološkom laboratoriju. Pravilan postupak pranja i dezinfekcije ruku ključan je za sprječavanje kontaminacije uzoraka, smanjenje rizika izlaganja patogenima te očuvanje sigurnosti laboratorijskog osoblja. Ruke se čiste u tri osnovne situacije: prije početka rada s biološkim materijalom, tijekom rada kada postoji mogućnost kontaminacije te nakon završetka laboratorijskih aktivnosti ili uklanjanja zaštitnih rukavica. Osnovne metode higijene ruku uključuju pranje sapunom i vodom te primjenu alkoholnih dezinficijensa. Pranje sapunom uklanja prljavštinu i dio mikroorganizama, dok alkoholni dezinficijensi učinkovito smanjuju mikrobno opterećenje kada ruke nisu vidno zaprljane. Alkoholne otopine s koncentracijom 60–80% smatraju se najdjelotvornijima. U laboratoriju je posebno važno izbjegavati nakit i dugačke nokte jer smanjuju učinkovitost higijene ruku. Higijena ruku dio je šireg sustava biosigurnosti i ključna je u prevenciji laboratorijskih infekcija. Redovita edukacija, poštivanje protokola i pravilna uporaba osobne zaštitne opreme dodatno doprinose sigurnom radu s mikroorganizmima. Održavanje visokog standarda higijene ruku osigurava integritet laboratorijskih rezultata i štiti zdravlje svih članova laboratorijskog tima.	mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med., spec. mikrobiologije Matea Jokić Medaković, zdr. lab. tehničar Sanja Mandić, med. sestra	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor
Listopad 16.10.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Dinamika prokuživanja bakterijom <i>Coxiella burnetii</i> u profesionalno ekspoziciranih osoba u endemskom području Istre	Cilj ovog prospektivnog seroepidemiološkog istraživanja koje je provedeno u Istarskoj županiji u razdoblju od 2014. do 2016. godine bio je istražiti dinamiku prokuživanja bakterijom <i>Coxiella burnetii</i> u profesionalno izloženih osoba u južnom endemskom području Istre u odnosu na njezin sjeverni dio te utvrditi moguću međuzavisnost pojavnosti infekcije koksijelom u ljudi ovisno o prokuženosti životinja (ovce i koze). Granica između južnog endemskog i sjevernog dijela Istre, što se Q-groznice tiče, ne postoji, te se kod bolesnika s nespecifičnim febrilnim oboljenjem, osobito u kasnu zimu, proljeće i početak ljeta na području cijele Istarske županije treba uvijek diferencijalno dijagnostički misliti na Q-groznicu, osobito u profesionalno izloženih	dr.sc. Branka Sep- Ševerdija, dr. med., spec. epidemiologije	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor



HRVATSKA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA


Vinogradska cesta 29 10 000 Zagreb Tel: +385 1 3787906 Fax: +385 1 3787244 E-mail: hkzr@hkzr.hr URL: www.hkzr.hr OIB: 06195840134

osoba.

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS I CILJ	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
Studen 13.11.2026. u 12 ⁰⁰ sati	Point-of-care uređaji u dijagnostici covid- 19 bolesti i gripe	Point-of-care (POC) uređaji omogućuju brzu, dostupnu i decentraliziranu dijagnostiku respiratornih infekcija poput COVID-19 i gripe, bez potrebe za složenom laboratorijskom infrastrukturom. Njihova ključna prednost je kratko vrijeme do rezultata, što omogućuje pravodobno donošenje kliničkih odluka, izolaciju bolesnika i započinjanje terapije. U dijagnostici COVID-19 i gripe najčešće se primjenjuju tri vrste POC testova: antigenski testovi , molekularni (NAAT) POC sustavi te imunokromatografske metode . Antigenski testovi omogućuju identifikaciju virusnih proteina u roku od nekoliko minuta, a osobito su korisni u ranim fazama bolesti kada je virusno opterećenje visoko. POC molekularni testovi, temeljeni na RT-PCR ili izotermnim amplifikacijskim metodama (npr. LAMP), pružaju veću osjetljivost i specifičnost te se smatraju najpouzdanijim oblikom brze dijagnostike. Moderni uređaji često kombiniraju detekciju SARS-CoV-2 i influenza virusa u jednom testu, što olakšava diferencijalnu dijagnostiku tijekom sezone respiratornih infekcija.	mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr. med., spec. mikrobiologije Marijana Cukon, bacc.med.-lab.dijag. Sonja Ferencić, bacc.med.-lab.dijag.	ZZJZ Istarske županije – polivalentni porostor

ODGOVORNA OSOBA

Jasna Sanković, bacc.med.lab.dijagnostike





RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Aleksandar Stojanović, dr.med.

